

EPREUVE DE MATHEMATIQUES (1^{er} tour)

(Calculatrice non autorisée)

Durée : 2 heures

Coefficient : 05

L'épreuve comporte deux (2) parties indépendantes à traiter obligatoirement.

PREMIERE PARTIE : (10 points)


Dans cette partie, toutes les questions sont indépendantes.

I. Pour chacune des questions ci-dessous, écrire le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse.

1) Parmi les couples de réels suivants, un seul est solution du système $\begin{cases} 5x - 3y = 0 \\ x + y = 24 \end{cases}$
 Lequel ? a) (11 ; 13) ; b) (8 ; 16) ; c) (9 ; 15) ; d) (10 ; 14) **(0,5pt)**

2) (\mathcal{C}) est un cercle de centre A et de rayon $r = 4$ et (D) une droite du plan. La distance du point A à la droite (D) est égale à 3. La droite (D) coupe le cercle (\mathcal{C}) en :
 a) un point b) deux points c) trois points d) aucun point **(0,5pt)**

3) ABCDFGHE est un cube. I, J, K et M sont les milieux respectifs de [AB], [BC], [CD] et [GH]. Parmi les triangles suivants, lequel est rectangle ? **(0,5pt)**



- a) AJH b) BKH c) IDA d) AKH

II. 1) Résoudre dans \mathbb{R} , l'équation $\frac{3x-5}{2} = \frac{4-x}{3}$ **(1pt)**

2) Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) , on donne les points $M(-1 ; 3)$ et $P(-4 ; -2)$. Calculer la distance MP. **(1pt)**


3) Soit f la fonction rationnelle définie par $f(x) = \frac{3x^2-4}{(1+x)(2x-3)}$.
 Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f . **(1pt)**

4) Soit [MN] un segment de longueur 9 cm. En utilisant le théorème de Thalès, construire le point A sur [MN] tel que $MA = \frac{3}{4} MN$. **(1pt)**

5) Le triangle BEP est rectangles en E tel que $BE = 4$; $EP = 2$ et $BP = 2\sqrt{5}$.
 Calculer $\sin(\widehat{BPE})$ **(1pt)**

6) Soit APQ un triangle d'aire 14 cm^2 , O un point quelconque du plan. On note A'P'Q' l'image du triangle APQ par la symétrie de centre O. sans faire la figure, justifier que l'aire du triangle A'P'Q' est 14 cm^2 . **(1pt)**

- 7) Soit $A = 3\sqrt{12} - 2\sqrt{75} - 4\sqrt{3}$. Ecrire A sous la forme $a\sqrt{b}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$. **(0,5pt)**
- 8) Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) , on donne les droites
 $(D): 4x + y - 1 = 0$ et $(D'): y = \frac{1}{4}x - \frac{3}{5}$. Justifier que (D) et (D') sont perpendiculaires. **(1pt)**
- 9) La figure ci-dessous est la représentation graphique d'une application linéaire f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) , unité 1cm.




Déterminer l'expression $f(x)$ pour tout réel x . **(1pt)**

DEUXIEME PARTIE : (10 points)

Dans cette partie, I et II sont indépendantes.

I. (5 points)

Une étude statistique portant sur la durée de vie de lampes électriques a permis d'établir l'histogramme suivant :



1) Reproduire et compléter le tableau suivant : **(4pts)**

Durées de vie	$[0 ; 10[$	$[10 ; 20[$	$[20 ; 30[$	$[30 ; 40[$	$[40 ; 50[$
Effectifs					
Fréquences					
Fréquences cumulées croissantes					
Centres des classes					

- 2) Quelle est la classe modale ? **(0,5pt)**
- 3) En utilisant les centres des classes, calculer la durée de vie moyenne d'une lampe. **(0,5pt)**

II. (5 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) (Unité le centimètre. On donne les points $A(1 ; 2)$, $B(-2 ; 0)$ et $C(4 ; 0)$.

- 1) a) Placer les points A , B et C . **(0,75pt)**
 b) Déterminer une équation de la droite (Δ) passant par les points A et B . **(1pt)**
 c) En utilisant l'équation de la droite (Δ) , vérifier que $E(4 ; 4)$ est un point de (Δ) . **(1pt)**
- 2) On note C' le symétrique du point C par rapport au point A . placer le point C' et calculer les coordonnées de C' . **(1,25pt)**
- 3) Démontrer que les vecteurs \vec{CE} et \vec{CB} sont orthogonaux. **(1pt)**